

Występowanie *Eucarta amethystina* (HÜBNER, 1803)
(Lepidoptera: Noctuidae) w Polsce

Distribution of *Eucarta amethystina* (HÜBNER, 1803)
(Lepidoptera: Noctuidae) in Poland

Roman WAŚALA¹, Adam GÓRNICKI²

¹Katedra Entomologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 159,
60-594 Poznań; e-mail: rwasala@up.poznan.pl

²ul. Przemysława 9B, 37-700 Przemyśl

ABSTRACT: New locality of *Eucarta amethystina* (HBN.) in Przemyśl Hills is presented.

KEY WORDS: Lepidoptera, Noctuidae, *Eucarta amethystina*, faunistics, Przemyśl Hills, SE Poland.


Rodzaj *Eucarta* LEDERER, 1857 jest w Europie reprezentowany przez dwa gatunki: *E. virgo* (TREITSCHKE, 1835) oraz *E. amethystina* (HÜBNER, 1803) (FIBIGER, HACKER 2005).

Gąsienice *E. amethystina* żerują w przyziemnych liściach dzikiej marchwi (*Daucus carota* L.) i podczas spoczynku są trudne do zauważenia (ROMANISZYN 1929). Mogą także żerować na roślinach z rodzajów: gorysz – *Peucedanum* L., pietruszka – *Petroselinum* HILL., lepnica – *Silene* L. (NOWACKI 1998). Postacie dorosłe pojawiają się w dwóch pokoleniach od maja do sierpnia; preferują otwarte biotopy. Są to najczęściej brzegi rzek i strumieni, wilgotne łąki i doliny rzeczne.

Podczas badań prowadzonych na terenie Pogórza Przemyskiego został odłowiony jeden okaz *Eucarta amethystina*:

– Makowa (UTM: FA20), 14 VII 2002 – 1 ♀, leg. A. GÓRNICKI, w środowisku murawy kserotermicznej, odległej o 200–300 m od najbliższego cieków wodnego.

Odłowiony gatunek wykazywany był z Polski rzadko. Wcześniej znany był z dwóch województw: dolnośląskiego oraz podkarpackiego (BUSZKO, NOWACKI 2000). W XIX wieku stwierdzony został na południowym-zachodzie



Ryc. Stanowiska *Encarta amethystina* (HBN.) w Polsce: + – stanowiska historyczne, ● – stanowisko po roku 2000, ? – stanowisko wątpliwe

Fig. Localities of *Encarta amethystina* (HBN.) in Poland: + – historic localities, ● – locality after 2000, ? – doubtful locality

kraju, w Legnicy i w Prochowicach. Dane dotyczące okazów z Ziemi Kłodzkiej są niepewne (WOLF 1935–1944). Na wschodzie Polski był wykazany w roku 1957 z Pogórza Bieszczadzkiego, z miejscowości Rabe koło Baligrodu oraz wcześniej z Olchowej koło Leska (BIELEWICZ 1973).

Na mapce (Ryc.) przedstawiono wszystkie znane stanowiska występowania w Polsce *Eucarta amethystina*.

SUMMARY

During field research in Przemyśl Hills a single specimen of *Eucarta amethystina* (HBN.) was collected. Previous data on the occurrence of this species in Poland are discussed. All known localities are presented on the map.

PIŚMIENNICTWO

- BIELEWICZ M. 1973: Motyle Bieszczadów Zachodnich i Pogórza Przemyskiego, cz. I tzw. Macrolepidoptera. Roczn. Muz. Górnośl., Przyroda, Bytom, 7: 1-170.
- BUSZKO J., NOWACKI J. 2000: The Lepidoptera of Poland, a distributional checklist. Pol. entomol. Monogr., Poznań – Toruń, 1: 1-178.
- FIBIGER M., HACKER H. 2005: Systematic List of Noctuoidea of Europe (Notodontidae, Nolidae, Arctiidae, Lymantridae, Erebidae, Micronoctuidae, and Noctuidae). Esperiana, 11: 93-205.
- NOWACKI J. 1998: The Noctuids (Lepidoptera, Noctuidae) of Central Europe. Bratislava. 51 ss.
- ROMANISZYN J., SCHILLE F. 1929: Fauna motyli Polski. I. Prace monogr. Kom. Fizjogr. PAU, Kraków, 6: 1-552.
- WOLF P. 1935–1944: Die Großschmetterlinge Schlesiens. (2). Breslau: 161-344.

