Wiadomości Entomologiczne	**38** (4) 246-247	Poznań 2019

KRÓTKIE DONIESIENIA

SHORT COMMUNICATIONS

820 Nowe stanowisko *Ochodaeus chrysomeloides* (SCHRANK, 1781) (Coleoptera: Ochodaeidae) w Polsce

New locality of *Ochodaeus chrysomeloides* (SCHRANK, 1781) (Coleoptera: Ochodaeidae) in Poland

KEY WORDS: Coleoptera, Ochodaeidae, *Ochodaeus chrysomeloides*, new record, Mazowiecka Lowland.

Wygonak zmierzchowy *O. chrysomeloides*, to jedyny reprezentant rodziny Ochodaeidae (nadrodzina Scarabaeoidea) występujący w Polsce. Podczas prac terenowych realizowanych w Puszczy Kozienickiej odkryto nowe stanowisko tego gatunku:

– EC21 Nadleśnictwo Kozienice, leśnictwo Cztery Kopce, 19 VII 2019, 2 exx., oddz. 114h/i, ad lucem, leg. M. MIŁKOWSKI.

Siedlisko w którym odłowiono chrząszcze to drzewostan gospodarczy z dominującą sosną zwyczajną w wieku ponad 100 lat, pojedynczymi dębami w wieku ok. 60 lat oraz brzozami w wieku ok. 45 lat. Ekran zlokalizowany był przy piaszczystej drodze w miejscu, gdzie zwarcie drzewostanu ma charakter umiarkowany. Chrząszcze przyleciały do światła podczas bardzo ciepłego wieczoru, między godziną 22^{00} a 23^{00}.

Imagines tego gatunku obserwowane są stosunkowo rzadko, gdyż prowadzą skryty tryb życia. Są aktywne o zmierzchu i nocą. Ich larwy odżywiają się prawdopodobnie podziemnymi owocnikami grzybów (BYK i in. 2016: Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 4 (49A): 124-141). Stanowiska wygonaka zlokalizowane są często w pobliżu dolin rzecznych. Wskazują na to m.in. współczesne informacje dotyczące dolin Odry, Warty, Bugu (BUNALSKI i SIENKIEWICZ 2012: Wiad. Entomol., **31** (4): 262-266; BYK i in. op. cit.), a w niniejszym przypadku doliny Wisły. Poławiany był także na wyżej położonych, a jednocześnie stosunkowo suchych i ciepłych stanowiskach, na Wyżynie Małopolskiej i w Górach Świętokrzyskich (BYK i in. op. cit.).

Wygonak jest w naszym kraju objęty ochroną gatunkową częściową. Ponadto umieszczony został na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce z kategorią EN (PAWŁOWSKI i in. 2002: Coleoptera Chrząszcze. (ss. 88-110) [W:] Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. IOP PAN, Kraków).

Marek MIŁKOWSKI, Radom

821 Nowe stanowiska *Coprimorphus scrutator* (HERBST, 1789) i *Melinopterus consputus* (CREUTZER, 1799) (Coleoptera: Scarabaeidae) na Wyżynie Małopolskiej i w Górach Świętokrzyskich

New localities of *Coprimorphus scrutator* (HERBST, 1789) and *Melinopterus consputus* (CREUTZER, 1799) (Coleoptera: Scarabaeidae) in the Małopolska Upland and the Świętokrzyskie Mountais

KEY WORDS: *Coprimorphus scrutator*, *Melinopterus consputus*, Małopolska Upland, Świętokrzyskie Mts., new localities.

Coprimorphus scrutator (HERBST, 1789) – jest gatunkiem występującym głównie w południowej części Europy. W Polsce znany z kilku stanowisk w południowej części kraju. Nowsze dane pochodzą z Przełęczy Dukielskiej (BUNALSKI i SZWAŁKO 1989: Przegl. Zool., **33** (2): 55-60), Beskidu Zachodniego (BIDAS i CIEŚLAK 2006: Wiad. Entomol., **25** (3): 183) i Bieszczad (ZIĘBA i DWORAKOWSKI 2008: Wiad. Entomol., **27** (3): 168). Z Wyżyny Małopolskiej znany jest ze Skowronna (BIDAS 2004: Wiad. Entomol., **23** (4): 245-256) i Galowa (BIDAS 2018: Wiad. Entomol., **37** (1): 55-56). Na podstawie ostatnich obserwacji można wnioskować że gatunek poszerza swój zasięg w kierunku północnym.

Poniżej podaję nowe stanowiska tego gatunku.

Wyżyna Małopolska:
- DA87 Ucisków ad Nowy Korczyn, 5 VIII 2018, 5 exx., w odchodach krów;
- DA79 Chrabków ad Busko Zdrój, 1 IX 2018, 2 exx; 24 IX 2019, 4 exx., w odchodach krów.

Góry Świętokrzyskie:
- DB73 Kielce–Ostra Górka, 18 VIII 2019, 6 exx., w odchodach krów.

Gatunek nowy dla tej krainy.

Melinopterus consputus (CREUTZER, 1799) – jest gatunkiem występującym w południowej i środkowej Europie, Afryce Północnej oraz Azji Mniejszej. W Polsce niezwykle rzadki, większość danych pochodzi sprzed stu lat (BURAKOWSKI i in. 1983: Kat. Fauny Pol., 23, **9**: 1-294). Ostatnio wykazany z Niziny Wielkopolskiej (BUNALSKI 1996: Wiad. Entomol. **15** (3): 139-146) i Niziny Mazowieckiej (BIDAS i in. 2011: Wiad. Entomol., **30** (4): 265).

Poniżej podaję nowe stanowisko tego gatunku.

Wyżyna Małopolska:
- DA79 Chruścice ad Pińczów, 19 X 2019, 1 ex, w odchodach krowy.

Gatunek nowy dla tej krainy.

Okazy dowodowe obydwu gatunków zostały zebrane przez autora i znajdują się w jego kolekcji.

Marek BIDAS, Kielce